Mesure des Temps de Coagulation (PT, aPTT)

COAGPOC



Pour plus d'infos, contactez votre délégué

KITVIA

Le diagnostic vétérinaire en toute confiance

Quand mesurer les temps de coagulation ?

A l'admission (minimal data base)

- Tout animal présentant un saignement, même minime
- Tout animal présentant des troubles hépatiques
- Tout animal cancéreux (mastocytome, lymphome)
- Tout animal ayant subi un polytraumatisme
- Tout animal présentant un état de choc sévère
- Toute suspicion d'intoxication aux raticides
- Tout animal présentant une infection généralisée sévère, une anémie hémolytique, un coup de chaleur, une morsure par serpent...

En périopératoire ou hospitalisation

- Lors de mammectomie, rhino-palatoplastie, splénectomie, entérectomie
- Lors de SDTE, pyométre, lavage abdominal
- Lors de saignement / hémorragie mal / difficilement contrôle
- Lors de thérapeutique anticoagulante (héparinothérapie...)
- Lors de fluidothérapie massive
- Lors de transfusion sanguine répétée
- Lors de péritonite, pancréatite, cholangite, cholangio-hépatite, gastro-entérite sévère, lipidose







Mesure PT-INR (Taux de Prothrombine ou Temps de Quick) et aPTT (Temps de Céphaline Activé)

- Seulement 20µl de sang
- Calibration automatique sur chaque bandelette
- Aucune maintenance
- Jusqu'à 2000 résultats mémorisés
- Bandelettes conditionnées par 12 > aucun gaspillage !
- Sensibilité à l'héparine : 3U/mL
- Coefficient de variation : <5%
- Plage hématocrite de fonctionnement : 20% - 70%
- Gamme de mesure : PT : 5 - 75 sec I APTT : 6,5 - 500 sec

VALEURS NORMALES

	PT	APTT
CHIEN	12 - 17 sec	96 - 116 sec
CHAT	13 - 20 sec	96 - 124 sec





CARACTÉRISTIQUES

Interface	Ecran Couleur LCD tactile 3.5'' 320 × 480
Lecteur de poche	148 mm x 70 mm x 26 mm / 203 g
Fonctionnement du système	Température : 10°C à 35°C Humidité : 10% à 90%
Sans fil	Batterie rechargeable

KITVIA SAS
16 chemin Perbost 31800 LABARTHE-INARD, France

KITVIA
www.kitvia.com